



### Point climatique et phénologique :

Les températures supérieures aux normales depuis mi avril ont accéléré le développement de la végétation.

Observations du 19 / 20 Avril	Zone très précoce et Zone précoce	Zone tardive
<b>Exemples</b>	Pourtour de l'étang de Berre, Cassis, Arles, Tarascon, Noves, St Rémy de Provence, Eyguières, Pélissanne , Lambesc	Venelles, Eguilles, St Cannat, le Puy Ste Réparate, Trets, Rousset, Rognes, Lambesc, Puyloubier, Eygalières
<b>Stades observés</b>	E,F,G	D,E,F

### **Bulletin de la Santé du Végétal (BSV)**

Il est consultable à l'adresse suivante [www.agrometeo.fr](http://www.agrometeo.fr) et sert de référence aux préconisations réalisés dans ce bulletin.

### **Protection contre l' excoriose (guide 2010, P 10 et 11)**

Une intervention est encore possible pour les parcelles au stade D-E touchées par l' excoriose en zone tardive.

### **Mildiou : (guide 2010, P 14 à19)**

#### Observations :

Deux foyers primaires ont été découverts en zone très précoce :

- 1 découvert à Cassis sur un remplaçant de 2 ans par la CA 13 ,
- 1 découvert sur une vigne abandonnée avec des rameaux au sol au sud d'Avignon par la CA 84.

Ils sont issus des pluies de début avril.

#### Cas général:

**Aucune intervention n'est à réaliser pour l'instant.**

La présence de feuilles au niveau du sol rend possible après une pluie conséquente avec une température supérieure à 10 °C l'extériorisation de foyers primaires 10-14 jours plus tard.

En fonction de la climatologie à venir : consulter le répondeur téléphonique pour déterminer la stratégie à adopter.

#### Exception à la règle:

Compte tenu des 2 foyers primaires découverts en zone très précoce, il est conseillé pour les parcelles très sensibles en zone très précoce d'être protégé avant une prochaine pluie.

### Qu'est ce qu'une situation très sensible ?

- Parcelles difficiles d'accès après une pluie (faible portance du sol).
- Parcelles très sensibles : souvent isolées, humides, en bordure de cours d'eau, vigoureuses, cépages sensibles avec un historique mildiou bien identifié (2009, 2008, 2007...).

### Prophylaxie:

L'épamprage des rameaux au sol est un bon moyen pour limiter la sortie de foyers primaires après une pluie.

## Oïdium (guide 2010, P : 28-29) : rappel des stratégies

### Observations :

Le stade 5-6 feuilles étalées est atteint en secteur très précoce et le sera dans les prochains jours en secteur précoce.  
Des drapeaux sur Carignan sont observés actuellement.

### Stratégies :

Plusieurs stratégies sont possibles en début de protection selon la parcelle :

- ✓ *Cas général* : attendre le stade 12 feuilles étalées pour démarrer la protection.
- ✓ *Cas des parcelles à drapeaux et des parcelles sensibles* :

Parcelles à drapeaux Moins d'un drapeau /cep ↓	Parcelles à drapeaux Plus d'un drapeau /cep ↓	Parcelles sensibles (cépage sensible, attaque importante en 2009) ↓
<b>1 traitement</b>	<b>2 traitements</b>	<b>1 traitement</b>
Stade 5-6 feuilles étalées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stade 2 à 3 feuilles étalées</li> <li>• Renouvellement 8 jours après</li> </ul>	Stade 5-6 feuilles étalées.

## Vers de la grappe 1<sup>ère</sup> génération : (guide 2010, P : 23 à 25)

Les pontes sont observables en zone précoce et très précoce.  
Aucune intervention n'est à envisager actuellement.

L'équipe viticulture : 06.30.51.44.02  
Répondeur téléphonique : 04.42.23.81.00